

Випуск 3 з проблеми  
"Акушерство та гінекологія"  
Підстава: Рішення ПК  
"Акушерство та гінекологія"  
Протокол №4 від 6.12.2002 р.

ГОЛОВНОМУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ  
УПРАВЛІННЯ ОХОРАНИ ЗДОРОВ'Я  
ОБЛАСНОЇ, СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ  
ТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ  
АДМІНІСТРАЦІЙ

**№129 -2003**

**МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ "ПРОТЕФЛАЗІД"  
В ТЕРАПІЇ ФОНОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЙКИ МАТКИ  
ПРИ ПАПЛОМАВІРУСНІЙ ТА ГЕРПЕТИЧНИХ ІНФЕКЦІЯХ**

---

Інформаційний лист складено за матеріалами галузевого ДЦФ України  
**Відповідальний за випуск: проф. А.Р. Уваренко**

---

Підписано до друку 20.04.2003. Друк, арк. 0,13. Обл.-вид. арк. 0,08. Тир. 100 прим.  
Замовлення № 129 Фотоофсетна лаб. Укрмедпатентінформ МОЗ України,  
01004, Київ, вул. Горького, 19/21

УСТАНОВИ-РОЗРОБНИКИ:  
**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДЕРЖАВНА  
МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ**  
**УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ  
МОЗ УКРАЇНИ**

А В Т О Р И :  
**КИШАКЕВИЧ І.Т.**  
**КУЧЕРЕНКО К.В.**

м. Київ

**Суть впровадження:** методика застосування препарату «Протефлазід» для лікування папіломавірусної та герметичної інфекції у жінок з фоновими захворюваннями шийки матки.

Пропонується для впровадження в практику жіночих консультацій, гінекологічних відділень, акушерських клінік методика застосування препарату "Протефлазід" для лікування жінок з фоновими захворюваннями шийки матки на тлі вірусної інфекції.

Високий рівень розповсюдження папіломавірусної та герпетичної інфекцій серед населення репродуктивного віку може відігравати значну роль у виникненні цервікальних уражень та в пухлинній трансформації клітин.

При ураженні генітального тракту вірусами відбуваються зміни показників місцевого імунітету, що в свою чергу призводить до порушення регенераційних властивостей слизової оболонки шийки матки. Застосування імуномодуючого та противірусного препарату при даній паталогії є обов'язковим та цілеспрямованим.

"Протефлазід" - препарат рослинного походження, який містить флавоноїди глікозидів диких злаків *Deschampsia caespitosa* L. та *Calamagrostis epigeios* L.

Первинний ефект дії препарату - можливість пригнічувати ДНК - полімеразу в клітинах інфікованих вірусами, внаслідок чого настає блокування реплікації вірусної ДНК і переривання ланцюга розмноження вірусу. Одночасно протефлазід збільшує продукцію ендогенних альфа- та гама- інтерферонів, підвищує активність макрофагальної системи та покращує окисно-відновні процеси в організмі.

Покази: папіломавірусна та герпетична інфекції у жінок з псевдоерозіями шийки матки.

Протипокази: виражений алергоз.

При вираженій чутливості організму до даного препарату (при місцевому застосуванні), можливі такі ускладнення, як гіперемія і набряк слизової піхви, печія. При наявності таких симптомів рекомендовано прийом

антигістамінних середників та збільшення розчинника у два рази.

Терапевтична дія протефлазиду при псевдоерозіях шийки матки на тлі папіломавірусної та герпетичної інфекцій обумовлена клінічними та лабораторними ефектами:

- прискорення епітелізації слизової оболонки шийки матки та нормоплазія плоского багатошарового епітелію;
- відновленням мікробіоцинозу піхви, внаслідок утворення гуморальних антитіл проти патогенних мікроорганізмів;
- баланс показників місцевого імунітету, за рахунок індукції інтерферону;
- негативні результати обстежень на віруси (діагностика методом ПЛР - зішкріб слизової оболонки шийки матки);
- зменшення площі патологічного осередку та відсутність запального процесу;
- покращання репродуктивної функції;
- зменшення частоти рецидивів;

Схема застосування препарату "Протефлазід ":

- препарат застосовується місцево у вигляді вагінальних тампонів змочених 3 мл. протефлазиду, розведених в 20 мл. фізіологічного розчину, 2 рази на добу, протягом 10 днів.
- одночасно протефлазід застосовується орально у вигляді крапель нанесених на цукор або шматочок хліба за схемою:
  - по 5 крапель 3 рази на добу - 1 -й тиждень;
  - по 10 крапель 3 рази на добу - 2, 3-й тиждень;
  - по 8 крапель 3 рази на добу - 4-й тиждень. Через 1,5-2 місяці курс лікування слід повторити. Препарат "Протефлазід" може застосовуватись як монопрепарат, так і в комплексі з іншими противірусними препаратами.

За додатковою інформацією з даної проблеми звертатися до авторів листа.